

# SIMPTOM AWAL HIPERTIROID



**Minggu** ini, kami akan menyingkap isu kesihatan berkaitan penyakit hipertroid. Simptom awal hipertroid mungkin kelenjar tiroid di pangkal leher kelihatan bengkak. Kehilangan berat badan secara tiba-tiba tanpa sebab yang diketahui.

Degupan jantung cepat atau tidak teratur, perubahan mata dan gegaran sedikit dijari tangan. Ini sedikit sebanyak mengganggu tidur dan berasa tidak selesa.

Bagaimana doktor tahu saya mempunyai hipertiroidisme?

Diagnosa boleh disahkan dengan ujian darah yang

mengukur jumlah hormon tiroid dalam darah. Jika ujian darah anda menunjukkan tiroid terlalu aktif, doktor akan membuat imbasan tiroid untuk melihat jika keseluruhan tiroid terjejas (menunjukkan penyakit Graves) atau jika anda mempunyai nodul tiroid atau thyroditis.

Doktor boleh melakukan ujian iodin pengambilan radioaktif untuk mengukur keupayaan tiroid anda untuk mengambil iodin. Pengambilan tinggi iodin bermakna kelenjar tiroid anda menghasilkan terlalu banyak hormon, yang menunjukkan penyakit Graves atau nodul tiroid terlebih aktif.

Pengambilan rendah iodin menunjukkan penyakit hipertiroid sebagai punca Graves. Selain gejala di atas, kira-kira 30 peratus pesakit dengan penyakit Graves mempunyai kesan seperti mata membengkak, terlalu sensitif pada sinaran cahaya, kesakitan atau tekanan dalam mata serta kemerahan atau keradangan dalam atau di sekitar mata.

- Denyuan jantung cepat atau tidak teratur atau berdebar-debar
- Peningkatan kekerapan dalam pergerakan usus
- Gegaran di jari atau tangan
- Masalah tidur
- Penipisan kulit
- Perubahan dalam rambut yang menjadikannya halus dan rapuh
- Perubahan dalam kitaran haid anda

Apabila mula mendapat hipertiroid, anda mungkin mempercepatkan metabolisme anda dengan

ketara dan menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan.

Beberapa tanda biasa termasuk:

- Rasa gementar, cemas, atau cepat marah
- Mengalami perubahan mood
- Rasa sangat lemah atau lemah
- Peka kepada haba
- Kelenjar tiroid membesar (goiter). Ini boleh membuat pangkal leher anda kelihatan bengkak
- Kehilangan berat badan secara tiba-tiba tanpa sebab yang diketahui

Aktiviti tiroid rendah (kekal (hipotiroidisme) tetapi ini boleh dirawat dengan makanan tambahan enam bulan.

Walaupun kelembaban biasanya adalah hasil akhir, tetapi ini boleh dirawat dengan makanan tambahan tiroid.

Walaupun kelembaban mengalih bahan radioaktif, rawatan ini telah digunakan lebih dari 60 tahun tanpa sebarang masalah. Kebanyakan orang dewasa di Amerika Syarikat (AS) menghadapi hipertiroid dirawat dengan iodin radioaktif.

- Penghalang Beta - tidak kira apa kaedah rawatan yang digunakan, doktor anda boleh menetapkan ubat beta blocker untuk memperlakukkan kadar denyutan jantung dan mengurangkan gejala berdebar, gementar dan cemas sehingga tahap tiroid anda lebih dekat dengan normal.